



Erratum

Im Beitrag „Antidiabetische Medikation in den ersten vier Therapiejahren. Eine Studie auf Basis von Krankenkassendaten“ (Dtsch Med Wochenschr 2017; 142: e1-e9) lautet in Tabelle 1 die korrekte Zahl für Metformin in der Altersgruppe 40-49 Jahre der Männer 71,2.



► **Abb. 3** Im Therapieverlauf verordnete antidiabetische Wirkstoffe (Nachbeobachtung vier Jahre ab Erstverordnung eines Antidiabetikums in 2008). Im Nenner alle Patienten mit Erstverordnung Antidiabetikum in 2008, die am 1.Tag des jeweiligen Quartals noch unter Antidiabetikamedikation standen; Medikation mit mehreren Wirkstoffen möglich.



► **Abb. 4** Patienten mit Erstmedikation Metformin- oder Sulfonylharnstoff-Monotherapie in 2008 – Erste Therapieveränderung innerhalb von vier Jahren Nachbeobachtung. Patienten mit einer Therapieveränderung innerhalb von vier Jahren ab Erstverordnung (= 100 %): n = 454 (Beginn mit Metformin) n = 172 (Beginn mit Sulfonylharnstoff). Met <> Sul: Wechsel von Metformin zu Sulfonylharnstoff bzw. umgekehrt; Met/Sul Kombi.: Wechsel zu Kombinationstherapie Metformin und Sulfonylharnstoff; plus DPP: zusätzlich DPP4-Inhibitor; plus Insulin: zusätzlich Insulin, Insulin mono: Umstellung auf Insulin in Monotherapie.



